

Kliiniline küsimus nr 12

Kas kõigil aversiivseid ravimeid saavatel alkoholisõltuvusega patsientidel rakendada abstinentsi säilitamiseks tabletravi (jälgitud kasutamine vs mittejälgitud kasutamine) vs subkutaanset implantaati?

Töörühma soovitus:			
Kõigil aversiivseid ravimeid saavatel alkoholisõltuvusega patsientidel kasutage abstinentsi säilitamiseks jälgitud suukaudset ravi. (tugev positiivne).			
Patsient/sihtrühm	Alkoholisõltuvad patsiendid, kes on eelnevalt saanud raviks aversiivseid ravimeid.		
Sekkumine	Disulfiraam suukaudselt või implanteeritavana		
Tegur	Otsus	Selgitus	
Väga hea või keskmise kvaliteediga tõendusmaterjal (kas tõendusmaterjal on väga kvaliteetne?) <i>(Mida kõrgem on tõendusmaterjali kvaliteet, seda tugevam on soovitus)</i>	x Jah ☐ Ei	Tõendusmaterjal piisav jälgitud suukaudse disulfiraami ravi osas.	<u>Jälgitud vs mitte jälgitud disulfiraami tabletravi:</u> kõige parema ülevaate annab 2011 aasta hea kvaliteediga meta-analüüsis, kus superviseeritud disulfiraam annab parema ravisoostumuse, kuid disulfiraami üldine efekti suurus on väike. Vt EvSu. Skin nr 2014 süstemaatiline ülevaade on selleks hea täiendus, kuna esmakordselt haarab efekti suuruse hindamisel võrdlusesse open-label ja blinded RCT+d. Kokkuvõtvalt leiti, et disulfiraami efekt on hea open-label uuringutes, aktiivravi grupp teab, et võtab aktiivravimit ning kontrollgrupp teab, et ei võta. See põhineb otseselt psühholoogilisel hirmu. Kui aga võrreldi kahte pimedat uuringut, siis disulfiraami ja kontrollgrupi vahel erinevusi ei leitud, kuna mõlemad grupid olid nõ. psühhol. Hirmu all. Kui sellised uuringud kaasati disulfiraami üldise efektiivsuse hindamisse (varasemate meta-analüüside korral), siis võtsid need oluliselt efekti suurust maha. <u>Tabletravi vs implantaat:</u> Baseerudes meta-analüüs 2011, on tõendusmaterjal

			disulfiraami implantaadi kasutamiseks väga nõrk.
Kindlustunne kasude ning kahjude ja koormuse tasakaalu suhtes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on erinevus soovitatavate ja soovimatute tagajärgede vahel ning kindlustunne selle erinevuse suhtes, seda tõenäolisem on tugev soovitus. Mida väiksem on tegelik kasu ja mida väiksem on kindlustunne selle kasu suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus</i>	☒ Jah ☐ Ei	Disulfiraami implantaat on võrreldav platseeboefektiga.	Disulfiraami tabeltravist on mõõdukas kindlustunne, et pigem on sekkumisest kasu kui kahju. Suhe kasude ja riskide vahel on ebakindel disulfiraami implantaadi korral.
Kindlus või sarnasus väärtustes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on varieeruvus või ebakindlus patsiendi väärtuste ja eelistuste suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik või nõrk soovitus.</i>	☐ Jah ☒ Ei	On patsiente, kes eelistavad implaneeritud disulfiraami ning see toimib neil abstinentsi säilitamisel hästi. Arstiteadusest lähtuvalt on arstil raske soovitada patsiendile midagi, millel ei ole tõendeid selle efektiivsusest.	Töörühm otsustas, et patsiendile pakub rohkem väärtust Ja vähem väärtust
Ressursi tähendus (kas tarbitud ressursid olid väärt oodatavat kasu) <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus.</i>	☒ Jah ☐ Ei		NICE 2011 ravijuhendist disulfiraami majanduslik profiil allolevas tabelis.
Soovituse üldine tugevus <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus.</i>			

Economic profile

Disulfiram or combination of drugs versus placebo/usual care

Study & country	Limitations	Applicability	Other comments	Incremental cost (£)	Incremental effect (QALYs)	ICER (£/QALY)	Uncertainty
Slattery <i>et al.</i> , 2003 Scotland	Minor limitations ²⁶	Partially applicable ²⁷	Effectiveness data based on RCTs of unsupervised disulfiram therapy. Costs of supervision, however, included. 6 months of treatment	230 496 ²⁸	38	6 103/ additional abstinent patient	40 716/ additional abstinent patient - standard care dominates; range in one way sensitivity analysis