

Kliiniline küsimus nr 14_antiagregant

Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel järgmiste ravimite kasutamise ja annustamise otsustamisel tuleb arvestada neerufunktsiooni (kreatiniin, eGFR) väärtusi vs mitte:

- aspiriin

Tulemusnäitajad: kroonilise neeruhaiguse ravi tulemuslikkus, põhihaiguse ravi tulemuslikkus, äge neerukahjustus, kroonilise neeruhaiguse progresseerumine, neeruasendusravi, hospitaliseerimine, patsiendi elukvaliteet, ravikulu, elulemus, üldsuse vahenemine

Töörühma soovitus: Kui kasutate kroonilise neeruhaigusega patsientide südame- ja veresoonkonnahaiguste primaarseks ennetuseks antiagregantravi, kaaluge võimaliku kardiovaskulaarse kasu ja veritsuse riski suhet. – hea tava suunis			
Patsient/sihtrühm	Kroonilise neeruhaigusega üle 18-aastased patsiendid		
Sekkumine	Antiagregantravi kasutamine kroonilise neeruhaigusega patsientidel, antiagregantravi annustamine		
Tegur	Otsus	Selgitus	
Väga hea või keskmise kvaliteediga tõendusmaterjal (kas tõendusmaterjal on väga kvaliteetne?) <i>(Mida kõrgem on tõendusmaterjali kvaliteet, seda tugevam on soovitus)</i>	☐ Jah ☒ Ei	Tegemist on populatsioonipõhiste uuringutega, mille tulemused on vastuolulised. Tõendusmaterjal mõõduka kuni madala kvaliteediga.	
Kindlustunne kasude ning kahjude ja koormuse tasakaalu suhtes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on erinevus soovitatavate ja soovimatute tagajärgede vahel ning kindlustunne selle erinevuse suhtes, seda tõenäolisem on tugev soovitus. Mida väiksem on tegelik kasu ja mida väiksem on kindlustunne selle kasu suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus</i>	☐ Jah ☒ Ei	Olemasoleva tõendusmaterjali tulemused on vastukäivad, mistõttu pole võimalik sõnastada ühtset ega tugevat soovitus.	
Kindlus või sarnasus väärtustes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on varieeruvus</i>	☐ Jah	Tõendusmaterjali ebaühtlus tulemustes tekitab ebakindlust soovituse sõnastamisel. Kuna	Töörühm otsustas, et patsiendile pakub

<i>või ebakindlus patsiendi väärtuste ja eelistuste suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik või nõrk soovitus.</i>	X Ei	ebakindlatele suunistele on rajatud ka ravijuhendites antavad soovitusel, otsustas tööühm esile seada patsiendi ohutuse.	rohkem väärtust südame- ja veresoonehaiguste primaarseks ennetuseks antiagregantide, kasutamisel kaaluda võimaliku kardiovaskulaarse kasu ja veritsuse riski suhet. Ja vähem väärtust keskendumine võimalikule raviefektile.
Ressursi tähendus (kas tarbitud ressursid olid väärt oodatavat kasu) <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/ nõrk soovitus.</i>	☐ Jah X Ei	Majanduslikku mõju ei ole hinnatud.	
Soovituse üldine tugevus <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/ nõrk soovitus.</i>	Uncertain trade-offs = it is not clear whether the intervention does more good than harm.		