

Sepsise äratundmine

Süsteemne põletikureaktsioon*	
☐	Kehatemperatuur >38,3 või <36 °C
☐	Tahhükardia >90 löögi minutis
☐	Tahhüpnöe >20 korra minutis või PaCO ₂ <32 mm Hg
☐	Leukotsüütide arv >12 või <4 x10 ⁹ /l või üle 10% noori vorme (kepptomseid neutrofiile)

* Vähemalt kaks sümptomit neljast

Organpuudulikkus(ed)	
☐	Teadvushäire GKS <15
☐	Hingamissagedus ≥22/min
☐	Süstoolne vererõhk ≤100 mm Hg
☐	Laktaat >2 mmol/l
☐	Kreatiniin >171 μmol/l või oliguuria <500 ml päevas
☐	Bilirubiin >33 μmol/l
☐	Muu _____

Süsteemne põletikureaktsioon koos organpuudulikkusega vihjab sepsisele!

Infektsioonhaiguse anamnees, kaebused? Infektsiooni kolle ja tunnused?

Verekülvid ja empiiriline intravenoosne antimikroobne ravi!

Riskigrupid

- ☐ Vanus >75 a
- ☐ Immuunosupressioon - diabeet, kemoteraapia, süsteemne kortikosteroidravi
- ☐ Viimase 6 nädala jooksul tehtud operatsioon või invasiivne protseduur
- ☐ Naha haavad, põletus
- ☐ Püsikateetrid või -liinid (nt kusepõie kateeter, tsentraalveeni kateeter, dialüüsi sond)
- ☐ Süstitavate narkootikumide tarvitamine

Sepsise esmane diagnostika ja ravi

