KOK-i ravis kasutatavad inhaleeritavad ravimid (seisuga 01.01.2020)

Ravim	Manustamise viis	Annustamine inhaleerimisel (maksimaalne ööpäevane annus)*	Toime pikkus (t)
SABA			
fenoterool	MDI	100–200 µg vaj (800 µg)	4–6
salbutamool	MDI, DPI, siirup, nebuliseeritav lahus	100–200 µg vaj (800 µg)	4–6
SAMA			
ipratroopiumbromiid	MDI	40–80µg vaj (240 µg)	6–8
SABA+SAMA			
fenoterool/ipratroopium	MDI	200/80 µg vaj (800/640 µg)	6–8
LABA			
formoterool	DPI	9–12 µg x 2 (48 µg)	12+
indakaterool	DPI	150–300 µg x 1	24
salmeterool	MDI, DPI	50 µg x 2 (200)	12+
LAMA			
aklidiinium	DPI	322 µg x 2	12
glükopürrooniumbromiid	DPI	44 µg x 1	12–24
tiotroopiumbromiid	SMI	5 µg x 1	24
umeklidiinium	DPI	55 µg x 1	24
LABA+LAMA			
formoterool/aklidiinium	DPI	340/11,8 µg x 2	12
formoterool/ glükopürroonium	MDI	10/14,4 x 2	12
indakaterool/ glükopürroonium	DPI	85/43 µg x 1	12–24
olodaterool/tiotroopium	SMI	5/5 µg x 1	24
vilanterool/umeklidiinium	DPI	22/55 µg x 1	24
LABA+LAMA+IKS			
beklometasoon/ formoterool/ glükopürroonium	MDI	174/10/18 µg x 2	12
flutikasoon/vilanterool/ umeklidiinium	DPI	92/22/55 µg x 1	24
IKS/LABA			
beklometasoon/ formoterool	MDI	12/200–400 µg x 2	12
budesoniid/formoterool	DPI	9/320µg x 2	12
flutikasoon/salmeterool	MDI, DPI	250–500/50 µg x 2	12
flutikasoon/vilanterool	DPI	92/22 µg x 1	24

* vajadusel kasutatavatel ravimitel

Lühendid: SABA – lühitoimeline β_2-agonist; SAMA – lühitoimeline antikolinergiline aine; LABA – pikatoimeline β_2-agonist; LAMA – pikatoimeline antikolinergiline aine; IKS – inhaleeritav glükokortikosteroid; vaj – vajaduse korral; µg – mikrogramm; t – tund; MDI – rõhu all olev mõõdetud annusega inhalaator (aerosoolinhalaator); DPI – kuivpulber-inhalaator; SMI – *soft mist*-tüüpi inhalaator