


Lisa 1

Patsiendi käsituslusalgoritm



MITTESPETSIIFILISE ALASELJAVALUGA patsiendi suunamine teise eriala spetsialisti juurde (vt ka juhendis lk 46–48)

Füsioterapeut

- Ägeda alaseljalavuga patsient, kel STarT seljavalu küsimustiku alusel valu krooniliseks muutumise risk keskmine või suur
- Ägeda alaseljalavuga patsient, kes vajab lisanõustamist igapäevaste tegevustega hakkamasaamiseks
- Alaägeda ja kroonilise alaseljalavuga patsiendid

Taastusarst

- Ägeda alaseljalavuga patsient, kel STarT seljavalu küsimustiku alusel valu krooniliseks muutumise risk keskmine, kellel valu püsib pärast esmasti füsioterapiat
- Ägeda alaseljalavuga patsient, kel STarT seljavalu küsimustiku alusel valu krooniliseks muutumise risk suur
- Alaägeda ja kroonilise alaseljalavuga patsiendid

Valuarst

- Ägeda alaseljalavuga patsient, kellel vaatamata maksimaalsele medikamentossele ravile püsib tugev valu
- Alaägeda ja kroonilise alaseljalavuga patsiendid, kellel ei saavutata konservatiivse raviga soovitud ravitulemust

Kliiniline psühholoog või psühchiaater

- Alaseljalavuga patsient, kel kaasuv psüühikahäire mõjutab oluliselt igapäevast tegevusvõimet
- Alaseljalavuga patsient, kel arst kahtlustab psüühikahäiret
- Alaseljalavuga patsient, kelle valu on seotud psühhosotsiaalse teguriga (negatiivne elusündmus, stress muul põhjusel – nt lein, raske haigus perekonnas)
- Kroonilise alaseljalavuga patsient, kel valufoonil on tekkinud ärevus, püsiv meeoleluhäire, unehäire

SPETSIIFILISE ALASELJAVALU KAHTLUSEGA patsiendi suunamist teise eriala spetsialisti juurde vt juhendis lk 46 ja 48