

Tulemusnäitajad: Alzheimeri tõve varajane diagnoosimine, ravitavate dementsuste välistamine, patsiendi stress, vastava tervishoiuteenuse vajaduse ja mahu prognoos.

1. Dementsussündroomi kahtlusel tuleb saata inimene dementsusega tegeleva spetsialisti juurde (neuroloog, psühhiaater, geriaater) või mälukliinikusse.

Kindlus või sarnasus väärtustes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on varieeruvus või ebakindlus patsiendi väärtuste ja eelistuste suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik või nõrk soovitus.</i>	X Jah ☐ Ei	Enamus patsiente soovib teada, kas neil on dementsuse diagnoos või mitte (Boustani et al.).	Töörühm otsustas, et patsiendile pakub rohkem väärtust Ja vähem väärtust
---	---	--	--

			
Ressursi tähendus (kas tarbitud ressursid olid väärt oodatavat kasu) <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus.</i>	X Jah ☐ Ei	Spetsilistide koolitus ning juurdepääs spetsilistidele	
Soovituse üldine tugevus <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus.</i>	Trade-offs = there are important trade-offs between the <u>benefits and harms.</u>		