

Lisa 9. Muude antidepressantide soovituslikud annused

*Modifitseeritud California töögrupi 2008. aasta ravijuhendi järgi,
Eesti Ravimiregister (17, 85)*

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mirtasapiin | Algannus: 7,5 mg enne magamaminekut Max: 30 mg enne magamaminekut | Üldiselt hästi talutav. Soodustab uinumist (väiksemas annuses). Võib tõsta söögiisu ja kehakaalu. Mõjutab seksuaalfunktsiooni vähe või üldse mitte. |
| Bupropioon | Max kohe toimeainet vabastav preparaat: 150 mg x 1. Max modifitseeritud toimeainet vabastav preparaati: 150 mg x 2. Max prolongeeritud toimeainet vabastav preparaati: 450 mg x 1. | Tõenäoliselt kiirelt aktiveeriv. Unetuse riski vähendamiseks anda teine annus enne kl 15. Mõjutab seksuaalfunktsiooni vähe või üldse mitte. Vältida agiteeritud patsientidel ja epilepsiaga patsientidel. |