



## **Ravijuhendi „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinud perinataalperioodi käsitus“ töörühma ja sekretariaadi koosolek nr 2**

Toimumisaeg ja -koht: 22.08.2022 kl 13-16.30 veebikoosolek Teamsis.

**Osalesid:** töörühma liikmed Pille Andresson, Liis Toome, Mari-Liis Ilmoja, Kadi Ploom, Birgit Suits, Merilin Lumpre, Irena Bartels, Svetlana Mürsepp ning sekretariaadi liikmed Liina Süvari, Maarja Hallik, Kadri Mägi, Kristel Soonets, Karina Luik ja Anna Vesper

**Kutsutud:** Laura-Liisa Liivamägi, Sale-Liis Teesalu

**Puudus (ette teatatud):** Tuuli Metsvaht, Katrin Truupõld, Aune Siller, Kristel Kukk

Koosolekut juhatas Pille Andresson, protokollis Anna Vesper

### **Koosoleku päevakord:**

#### **1. Ravijuhendi töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide deklaratsioonid**

Ravijuhendi koostajad (kahe töörühma liikme deklaratsioonid veel puuduvad) on esitanud huvide deklaratsioonid. Deklareeritud huvid arutatakse koosolekul läbi, ei esine huvide konflikte, mis vajaksid meetmete rakendamist.

Koosolekul osaleb kaheksa ravijuhendi töörühma liiget.

#### **2. Ravijuhendi käsitusala koostamine**

Ravijuhendi sekretariaat koostas eelmisel koosolekul läbi arutatud kliiniliste küsimuste alusel uue käsitusala. Käsitusalas on praegu 31 kliinilist küsimust. Iga küsimuse juures on toodud tulemusnäitajad. Käsitusala esitati töörühmale tutvumiseks ja täienduste tegemiseks aegsasti enne koosolekut.

Töörühm soovib teiste asjakohaste Eesti ravijuhenditena lisada käsitusalasse Eesti Naistearstide Seltsi teemakohased juhendid ning Eesti Perinatoloogia Seltsi poolt koostatud juhend „Vastsündinu elustamine ja esmase adaptatsiooni toetamine“ (juhend kinnitatakse septembris 2022).

Käsitusalas toodud kliiniliste küsimuste arutelu:

|    | <b>Küsimus</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Kommentaar/küsimuse muudetud sõnastus</b>                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kas kõikidele ähvardava enneaegse sünnitusega (enne 35 <sup>+0</sup> GN) naistele on näidustatud transvaginaalne ultraheliuuring või mitte emakaelapikkuse hindamiseks ja sünnitusaja prognoosimiseks? | Küsimuse sõnastus arusaadav, tulemusnäitajad sobivad.                         |
| 2. | Kas kõik ähvardava enneaegse sünnitusega rasedad tuleb ema                                                                                                                                             | Töörühm eriarvamusel perinataalkeskuse mõiste osas, küsimuses asendatakse see |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ravitulemi parandamiseks ning vastsündinu parema ravitulemi saavutamiseks tsentraliseerida perinataalkeskustesse võrreldes mittetsentraliseerimisega?                                                                                                                                                                                                                                    | „vastavate ravivõimalustega kõrgema etapi keskustega“. Tulemusnäitajad sobivad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Kas ähvardava enneaegse sünnituse korral, kui laps on gestatsioonivanuselt eluvõimelisuse piiril (22+0–23+6 GN), tuleb vastsündinu ravitulemi parandamiseks rakendada perinataalset proaktiivset ravi (transport keskusesse, kopsude ettevalmistus, keisrilõige lapsepoolsele näidustusel, neuroproteksioon, tokolüüs, antibiootikumravi) võrreldes proaktiivse ravi mitterakendamisega? | Proaktiivset ravi käsitlevate soovitude sisu osas ei ole muudatusi.<br>Endiselt on lahtine vanemate tahteavalduse osa ehk küsimusega seotud juriidiline pool (oli toodud ühe tegevusena algse ravijuhendi rakenduskavas). Küsimus sõnastatakse tervishoiukorraldusliku küsimusena: kuidas reguleerida seadusandlikult vanemate tahteavaldus ähvardava enneaegse sünnituse korral, kui laps on gestatsioonivanuselt eluvõimelisuse piiril (22 <sup>+0</sup> –23 <sup>+6</sup> )? |
| 4. | Kas üsasisese kasvupeetuse, intraamniootilise infektsiooni, raseda I, II tüüpi diabeedi, gestatsioonidiabeedi korral kasutada vastsündinu ravitulemi parandamiseks loote kopsude ettevalmistust glükokortikosteroididega?                                                                                                                                                                | Küsimus sõnastatakse ümber. Soovitakse teada, kas konkreetsete seisundite korral on vastsündinu parema ravitulemi saavutamiseks loote kopsude ettevalmistamisel vajalik kasutada glükokortikosteroidide täielikku skeemi või on efektiivne ka osalise skeemi kasutamine?                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Kas ähvardavate enneaegsete sünnituste korral on enneaegse vastsündinu ravitulemi parandamiseks näidustatud magneesiumsulfaadi korduv manustamine või mitte, kui ravi alustamisest on möödunud 24 või enam tundi?                                                                                                                                                                        | Algse ravijuhendi käsitusala küsimuse 5 alusel koostatud uus, täpsustav küsimus. Küsimuse sõnastus ja probleemi selgitus sobivad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. | Kas ähvardava ja/või käigusoleva enneaegse sünnituse korral rasedal rutiinselt emakakaelast või tupest aeroobse külvi võtmine võrreldes mitte võtmisega parandab vastsündinu tervisetulemit?                                                                                                                                                                                             | Täpsustatud küsimus, sõnastus sobib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | Kas lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedatel kasutada erütromütsiini esmaavaliku antibiootikumina võrreldes penitsilliini või klindamütsiini kasutamisega vastsündinu tervisetulemi parandamiseks?                                                                                                                                                       | Töörühm ei soovi küsimuses konkreetseid antibiootikume välja tuua. Soovitakse tõendusmaterjali analüüsi põhjal selgitada, millise ravimiga alustada (koorionamnioniidi kliiniliste tunnuste puudumisel), kas kasutada ühte preparaati või kombineeritud ravi ning kui pikalt ravida?<br>Küsimus sõnastatakse ümber: kas lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal alustada antibakteriaalset ravi või mitte vastsündinu ravitulemi parandamiseks?  |
| 8. | Kas kõikide enneaegsete sünnituste korral tuleb ema ravitulemi ning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sekretariaat on sõnastanud hetkel ühe küsimuse, kuid on arvamusel, et see sisaldab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>vastsündinu ravitulemi parandamiseks sünnitusviisi valikul arvestada järgmisi tegureid võrreldes mitteamvestamisega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mitmikrasedus (sh sõltuvalt esimese loote seisust);</li> <li>- vaginaalne sünnitus võrreldes keisrilõige sõltuvalt gestatsioonivanusest (<math>22^{+0}</math>–<math>23^{+6}</math> GN; <math>24^{+0}</math>–<math>25^{+6}</math> GN, <math>26^{+0}</math>–<math>29^{+6}</math> GN);</li> <li>- loote vaagnaotsseis võrreldes peaseis?</li> </ul> | <p>tegelikult kolme erinevat küsimust. Töörühm on nõus ning sõnastatakse eraldi küsimused:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kas enneaegsete sünnituste korral tuleb ema ning vastsündinu ravitulemi parandamiseks sõltuvalt gestatsioonivanusest (<math>22^{+0}</math>–<math>23^{+6}</math> GN; <math>24^{+0}</math>–<math>25^{+6}</math> GN, <math>26^{+0}</math>–<math>29^{+6}</math> GN) eelistada vaginaalset sünnitust või keisrilõiget?</li> <li>- Kas mitmikraseduse ja enneaegse sünnituse korral tuleb ema ning vastsündinu ravitulemi parandamiseks eelistada vaginaalset sünnitust või keisrilõiget (sh sõltuvalt esimese loote seisust)?</li> <li>- Kas enneaegse sünnituse korral, kui loode on vaagnaotsseisus, tuleb ema ning vastsündinu ravitulemi parandamiseks eelistada vaginaalset sünnitust või keisrilõiget (sõltuvalt gestatsioonivanusest: <math>22^{+0}</math>–<math>23^{+6}</math> GN; <math>24^{+0}</math>–<math>25^{+6}</math> GN, <math>26^{+0}</math>–<math>29^{+6}</math> GN)?</li> </ul> |
| 9.  | Kas lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnituse korral on näidustatud raseduse prolongeerimine (rohkem kui 48 tundi) või mitte ema tervisetulemi ning vastsündinu ravitulemi parandamiseks?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uus küsimus, sõnastus sobib. Töörühm koostab probleemi selgituse ning tulemusnäitajate loetelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | Kas tokolüüsi vajava ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal peaks parema ema ja vastsündinu ravitulemise saamiseks kasutama atosibaani või nifedipiini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uus küsimus, küsimuse sõnastus sobib, täiendatakse probleemi selgitust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Kas kõikidel enneaegsetel vastsündinutel kasutada ravitulemi parandamiseks esmase stabiliseerimise käigus viivitatud nabaväädi klemmimist või mitte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algse ravijuhendi käsitusala küsimuse 12 põhjal koostatakse kaks erinevat küsimust, sest need vajavad eraldi tõendusmaterjali analüüsi. Küsimuste sõnastus ja probleemi selgitused sobilikud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Kas enneaegsetel vastsündinutel kasutada ravitulemi parandamiseks esmase stabiliseerimise käigus nabaväädi lüpsmist, kui klemmimisega viivitamine ei ole võimalik või mitte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Kas enneaegsete vastsündinute esmasel stabiliseerimisel kasutada ravitulemi parandamiseks CPAP-ravi (mitteinvasiivse positiivse ekspiratoorse lõpprõhu kasutamine ilma täiendava sissehingamise toetuseta) võrreldes mitteinvasiivse ventilatsiooni või sünkroniseeritud mitteinvasiivse ventilatsiooniga?                                                                                                                                                                                                            | Algse ravijuhendi käsitusala kliinilise küsimuse 14 alusel koostatud täpsustav küsimus. Küsimuse sõnastus sobib, samuti selgitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Kas enneaegsete vastsündinute esmasel stabiliseerimisel kasutada ravitulemi parandamiseks ruumiõhku võrreldes kõrgema hapniku osakaaluga sissehingatava õhuga (FiO2)?                                                                                                                                                               | Algse ravijuhendi käsitusala küsimuse 15 avamine samas sõnastuses.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | Kas enneaegsete vastsündinute ravitulemit parandab hapnikravi kasutamisel kindlate saturatsiooni (SpO2) eesmärkväärtuste kasutamine võrreldes mittekasutamisega?                                                                                                                                                                    | Küsimuse sõnastus sobib, probleemi põhjendus samuti.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. | Kas enneaegsete vastsündinute esmasel stabiliseerimisel ravitulemi parandamiseks kasutada hemodünaamika hindamisel ja raviotsuste tegemisel kindlaid parameetreid ja eesmärkväärtuseid võrreldes nende mittekasutamisega?                                                                                                           | Algse ravijuhendi käsitusala küsimuse 17 avamine samas sõnastuses.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | Kas enneaegsete vastsündinute esmasel stabiliseerimisel parema ravitulemi saavutamiseks kasutada kindlat hüpotensiooni/hüpoperfusiooni ravimeetodit võrreldes mitte kasutamisega?                                                                                                                                                   | Küsimuse sõnastus sobib. Pisut täiendatakse probleemi selgitust.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. | Kas enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks profülaktilist surfaktantravi võrreldes mittekasutamisega?                                                                                                                                                                                                 | Algse ravijuhendi käsitusala küsimuse 19 avamine samas sõnastuses.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. | Kas hingamishäiretega enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks varast surfaktantravi võrreldes hilise surfaktantraviga?                                                                                                                                                                                 | Algse ravijuhendi käsitusala küsimuse 20 avamine täpsustatud sõnastusega.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. | Kas enneaegsetele vastsündinutele tuleb rakendada ravitulemi parandamiseks neonataalset intensiivravi kohapeal võrreldes vahetu sünnijärgse transpordiga?                                                                                                                                                                           | Sekretariaat soovib täpsustada, mille jaoks täpsemalt on vaja küsimust avada. Sõnastatud soovitusel kehtivad. Töörühma hinnangul on ravijuhendi valmimise järgselt avaldatud uut tõendusmaterjali. Selle alusel tuleb soovitusel üle vaadata. Küsimus jääb samas sõnastuses, täiendatakse probleemi selgitust.                |
| 21. | Kas enneaegsete vastsündinute parema ravitulemise saavutamiseks on varase parenteraalse toitmise eelistamine parem võrreldes hilise parenteraalse toitmise alustamisega:<br>- vedeliku vajadus sünnikaalu ja elupäevade kaupa,<br>- süsivesikute, valkude ja rasvade pakkumine parenteraalsel toitmisel kilogrammi kehakaalu kohta? | Sekretariaadi poolt ümber sõnastamata algse ravijuhendi käsitusala küsimus 23. Kuivõrd tegemist väga mahuka küsimusega, peaks selgelt sõnastama, mille kohta tõendusmaterjali otsida. Soovitused on enamasti kehtivad, võivad olla vähesed muudatused soovitatud toiduainete ja vedeliku kogustes (algse ravijuhendi lisa 8). |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osade tööühma liikmete hinnangul tuleks toitmise kohta koostada eraldi juhend. Tööühm otsustab jätta küsimuse avamata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22. | Kas enneaegsete vastsündinute parema ravitulemi saavutamiseks tuleb eelistada varast enteraalset toitmist võrreldes hilise enteraalse toitmise alustamisega:<br>- rinnapiim võrreldes doonorrinnapiim,<br>- doonorrinnapiim/rinnapiim võrreldes enneaegse vastsündinu piimasegu,<br>- kogused, skeem?                           | Sekretariaadi poolt ümber sõnastamata algse ravijuhendi käsitusala küsimus 24. Tegemist on mahuka küsimusega, seetõttu peaks selgelt sõnastama, mille kohta tõendusmaterjali otsida. Soovitused on enamasti kehtivad, võivad olla vähesed muudatused soovitatud kogustes (algse ravijuhendi lisa 8).<br>Osade tööühma liikmete hinnangul tuleks toitmise kohta koostada eraldi juhend. Tööühm otsustab jätta küsimuse avamata. |
| 23. | Kas enneaegsetel vastsündinutel <1500 g/< 32 <sup>+0</sup> GN parandab ravitulemusi probiootikumide kasutamine võrreldes nende mitte kasutamisega?                                                                                                                                                                              | Eelmisel koosolekul tehtud ettepaneku põhjal koostatud uus küsimus. Sõnastus ja probleemi selgitus sobivad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24. | Kas enneaegsete vastsündinute esmasel stabiliseerimisel manustada ravitulemuste parandamiseks kofeiini võrreldes kofeiini mittemanustamisega?                                                                                                                                                                                   | Algse ravijuhendi käsitusala kliinilise küsimuse 25 avamine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25. | Kas enneaegsetel vastsündinutel tuleb ravitulemi parandamiseks ennetada hemodünaamiliselt oluliselt avatud arterioosjuha erinevate ravivõtete (vedeliku piiramine, diureetikumravi, varane enteraalne toitmine, mitteinvasiivne ventilatsioon, profülaktiline mittesteroidne põletikuvastane aine) võrreldes mitte sekkumisega? | Algse ravijuhendi käsitusala kliinilise küsimuse 26 avamine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. | Kas enneaegsetel vastsündinutel tuleks teha hemodünaamiliselt oluliselt avatud arterioosjuha õigeaegseks diagnoosimiseks ja ravitulemi parandamiseks südame ultraheliuuring enne 72 elutundi või hiljem?                                                                                                                        | Uus küsimus, mis täpsustab hemodünaamiliselt oluliselt avatud arterioosjuha õigeaegset diagnoosimist. Küsimuse sõnastus ja probleemi põhjendus sobivad.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27. | Kas enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks hemodünaamiliselt oluliselt avatud arterioosjuha korral konservatiivset ravi (vedeliku piiramine, diureetikumid, mittesteroidsed põletikuvastased ained) võrreldes kirurgilise raviga?                                                                 | Uus küsimus. Tööühm soovib teada, millised on ravi alustamise kriteeriumid, preparaadid, raviskeemid, milline on optimaalne ravi. Küsimuse sõnastus sobib, täiendatakse probleemi selgitust.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28. | Kas kõikidel infektsiooni riskiteguritega enneaegsetel vastsündinutel kasutada ravitulemi                                                                                                                                                                                                                                       | Algse ravijuhendi käsitusala kliinilise küsimuse 26 avamine. Küsimuse sõnastus ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | parandamiseks profülaktilist antibakteriaalset ravi võrreldes mitte kasutamisega?                                                 | probleemi selgitus sobivad, täiendatakse tulemusnäitajate loetelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29. | Kas kõikidel enneaegsetel vastsündinutel kasutada ravitulemuste parandamiseks valuskooringut või mitte?                           | Uus küsimus, sõnastus ja probleemi selgitus sobivad. Töörühm soovib teada, milline on usaldusväärne valuskooring enneaegsete vastsündinute valu hindamiseks ning millisest gestatsiooninädalast valuskooringut kasutada? Täiendatakse tulemusnäitajate loetelu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30. | Kas enneaegse vastsündinu valuraviks kasutada ravitulemuste parandamiseks esmavalikuna paratsetamooli või muud ravimit?           | Eelmisel koosolekul tehtud ettepaneku alusel koostatud uus küsimus. Töörühm täpsustab küsimuse sõnastust. Enneaegse vastsündinu raviskeemi on tavapäraselt lisatud valuravim, lisaks kasutatakse erinevaid mittefarmakoloogilisi meetodeid. Soovitakse leida tõendusmaterjali just valulike toimingute korral kasutatavate ravimite kohta. Muudetud sõnastus: kas kõikidel enneaegsetel vastsündinutel kasutada valu ennetamiseks invasiivsete ja valulike toimingute läbiviimisel farmakoloogilist ravi või mitte? |
| 31. | Kas kõikidele enneaegsetele vastsündinutele on vajalik ravitulemuste parandamiseks teha rutiinselt aju ultraheliuuring või mitte? | Eelmisel koosolekul tehtud ettepaneku alusel koostatud uus küsimus. Töörühm täpsustab küsimuse sõnastust:<br>- Kas kõikidele enneaegsetele vastsündinutele on vajalik prognoosi hindamiseks ja ravitulemi parandamiseks teha rutiinselt aju ultraheliuuring või mitte?<br>Tulemusnäitajate loetelu sobib.                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                   | Lisatakse uus küsimus A-vitamiini kasutamise kohta, koostatakse probleemi selgitav tekst ning märgitakse tulemusnäitajad:<br>- Kas enneaegsel vastsündinul <1500 g/<32 <sup>+0</sup> GN parandab ravitulemusi A-vitamiini kasutamine võrreldes mitte kasutamisega?                                                                                                                                                                                                                                                  |

**OTSUS:** sekretariaat teeb vajalikud muudatused ja parandused ravijuhendi käsitusallas ning esitab lõpliku käsitusala töörühmale üle vaatamiseks ja kinnitamiseks. Tulemusnäitajate loetelu saadetakse töörühmale hinnangute andmiseks.

### 3. Muud küsimused (koosolekute ajakava ja edasised tegevused)

Kui ravijuhendi töörühm on käsitusala üle vaadanud ja kinnitanud ning hinnanud tulemusnäitajad, esitatakse käsitusala ravijuhendite nõukojale tutvumiseks ja sobivusel kinnitamiseks (nõukoja 13.09.2022 koosolekul).

Sekretariaat annab järgmise koosoleku aja teada esimesele võimalusel, kui ravijuhendi koostajad on teinud oma valikud aegade suhtes (Doodle küsimustik).

Järgmisel koosolekul alustatakse esimeste kliiniliste küsimuste tõendusmaterjali arutelu.