

Autor(id):

Küsimus: Kas lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal alustada antibakteriaalset ravi või mitte vastsündinu ravitulemi parandamiseks?

Kontekst: statsionaarne

Bibliograafia:

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, erütromütsiin vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ^{1a}	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 1.07 (0.43 to 2.66)	1 vähem / 1,000 (3 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
-----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, klindamütsiin vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 5.09 (0.36 to 71.58)	5 vähem / 1,000 (72 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, klindamütsiin-gentamütsiin vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.16 (0.03 to 1.00)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiin (cef) vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^b	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.67 (0.02 to 21.86)	1 vähem / 1,000 (22 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^b	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, penitsilliin vs platseebo (statistiliselt oluline) (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^c	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.46 (0.27 to 0.77)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^c	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, co-amoxiklav (CoA) vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^d	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.47 (0.19 to 1.20)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^d	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliin + makroliid (amino pcn+ mac) vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^e	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.60 (0.21 to 1.66)	1 vähem / 1,000 (2 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^e	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiin+makroliid (cef-mac) vs platseebo (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.54 (0.02 to 12.46)	1 vähem / 1,000 (12 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, klindamütsiin vs erütromütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 4.75 (0.40 to 56.84)	5 vähem / 1,000 (57 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, klindamütsiin+gentamütsiin vs klindamütsiin (stat oluline) (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.03 (0.00 to 0.78)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to -)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	------------------------------------	---------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, klindamütsiin+gentamütsiin vs erütromütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.15 (0.02 to 1.16)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------	----------

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid vs klindamütsiin+gentamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^b	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 4.19 (0.08 to 216.85)	4 vähem / 1,000 (217 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^b	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid vs klindamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^b	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.13 (0.00 to 10.42)	0 vähem / 1,000 (10 vähem to - -)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^b	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---------------------------------------	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid vs eütromütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^b	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.62 (0.02 to 22.89)	1 vähem / 1,000 (23 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^b	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, penitsilliinid vs tsefalosporiinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,c}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.69 (0.02 to 23.55)	1 vähem / 1,000 (24 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{b,c}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, penitsilliinid vs klindamütsiin+gentamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^c	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 2.89 (0.43 to 19.58)	3 vähem / 1,000 (20 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^c	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, penitsilliinid vs klindamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^c	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.09 (0.01 to 1.34)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^c	
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	--

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, penitsilliinid vs erütromütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^c	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.43 (0.15 to 1.22)	0 vähem / 1,000 (1 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^c	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, koamoksiklaav vs penitsilliinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,d}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 1.03 (0.38 to 2.78)	1 vähem / 1,000 (3 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{c,d}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, koamoksiklaav vs tsefalosporiinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,d}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.71 (0.02 to 26.34)	1 vähem / 1,000 (26 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{b,d}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, koamoksiklaav vs klindamütsiin+gentamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^d	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 2.98 (0.38 to 23.40)	3 vähem / 1,000 (23 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^d	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, koamoksiklaav vs klindamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^d	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.09 (0.01 to 1.53)	0 vähem / 1,000 (2 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^d	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, koamoksiklaav vs erütromütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^d	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.44 (0.12 to 1.62)	0 vähem / 1,000 (2 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^d	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliinid+makroliid vs koamoksiklaav

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{d,f}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 1.26 (0.32 to 5.01)	1 vähem / 1,000 (5 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{d,f}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliinid+makroliid vs penitsilliinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{n,f}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 1.30 (0.41 to 4.08)	1 vähem / 1,000 (4 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{d,f}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliinid+makroliid vs tsefalosporiinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{n,f}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.90 (0.03 to 25.27)	1 vähem / 1,000 (25 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{d,f}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliinid+makroliid vs klindamütsiin+gentamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^f	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 3.75 (0.46 to 30.86)	4 vähem / 1,000 (31 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^f	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliinid+makroliid vs klindamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^f	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.12 (0.01 to 1.99)	0 vähem / 1,000 (2 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^f	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, aminopenitsilliinid+makroliid vs erütromütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^f	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.56 (0.14 to 2.18)	1 vähem / 1,000 (2 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^f	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs aminopenitsilliinid+makroliid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,f}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.91 (0.05 to 17.58)	1 vähem / 1,000 (18 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{a,f}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs koamoksiklaav (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,e}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 1.14 (0.04 to 30.09)	1 vähem / 1,000 (30 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{a,e}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs penitsilliinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,e}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 1.18 (0.05 to 28.25)	1 vähem / 1,000 (28 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{a,e}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs tsefalosporiinid (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^{a,e}	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.81 (0.18 to 3.78)	1 vähem / 1,000 (4 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^{a,e}	CRITICAL
----------------	--------------------------	---------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs klindamütsiin+gentamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^e	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 3.41 (0.09 to 129.26)	3 vähem / 1,000 (129 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^e	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs klindamütsiin (hinnatud millega:: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suur ^e	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.11 (0.00 to 6.42)	0 vähem / 1,000 (6 vähem to --)	⊕⊕⊕○ Mõõdukas ^e	
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------	--

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kausus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Ema koorionamnioniidi esinemissagedus, tsefalosporiinid+makroliid vs erütromütsiin (hinnatud millega.: OR)

1 ¹	juhuslikustatud uuringud	suure	väike	väike	väike	puudub			šansside suhe (OR) 0.51 (0.02 to 13.21)	1 vähem / 1,000 (13 vähem to 0 vähem)	⊕⊕⊕⊖ Mõõdukas ^a	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	---	---	-------------------------------	----------

Latentseperiood (mediaanpäevades), ampitsilliin+roksitromütsiin vs tsefuroksiim+roksitromütsiin (84 naist)

1 ²	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub	ampi+roxy grupis 2,3 päeva cefu+roxy grupis 4,63 päeva p=0,039				⊕⊕⊕⊕ Kõrge	CRITICAL
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------	----------

Keisrilõige, ampitsilliin+roksitromütsiin vs tsefuroksiim+roksitromütsiin (84 naist)

1 ²	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub	ampi+roxy grupis 45% cefu+roxy grupis 38,6 % p=0,66				⊕⊕⊕⊕ Kõrge	IMPORTANT
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	---	--	--	--	---------------	-----------

Kleibsiilla pneumonia kasv, ampitsilliin+roksitromütsiin vs tsefuroksiim+roksitromütsiin (84 naist)

1 ²	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub	ampi+roxy 17,1% cefu+roxy 2,3 % p=0,04				⊕⊕⊕⊕ Kõrge	OLULINE
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	---------------	---------

E. coli ESBL, ampitsilliin+roksitromütsiin vs tsefuroksiim+roksitromütsiin (84 naist)

1 ²	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub	ampi+roxy 34,3% cefu+roxy 27,3% p=pole stat erinevust				⊕⊕⊕⊕ Kõrge	OLULINE
----------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	---	--	--	--	---------------	---------

Enterococcus Faecalis ampitsilliin+roksitromütsiin vs tsefuroksiim+roksitromütsiin (84 naist)

Tõendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Tõendatuse aste	Olulisus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke tõenäosus	Tõenduse ebakõla	Tõenduse kaudsus	Tõenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	lootevee enneaegse puhkemisega ähvardava enneaegse sünnitusega rasedal antibakteriaalse ravi alustamist	mitte	Suhteline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		
1 ²	juhuslikustatud uuringud	väike	väike	väike	väike	puudub	ampi+roxy 11,4% cefu+roxy 34 % p=0,032				⊕⊕⊕⊕ Kõrge	OLULINE

CI: confidence interval; OR: odds ratio

Selgitused

- a. Võrgustikmetaanalüüs, kokku kaasati 23 uuringut, 7671 rasedat.
- b. Erinevate klasside tsefalosporiinid läbisegi (cefazolin, cefotaxime, cefizoxime)
- c. Penitsilliinide hulka arvati penitsilliin, bensüülpenitsilliin, ampitsilliin, piperatsilliin, mezlotsilliin
- d. Co A on amoksitsilliin + klavuaanhape või ampitsilliin-sulbaktaam
- e. Tsefalosporiin-makroliid on ka tsefasoliin+erütomütsiin või tsefalosiin+klaritromütsiin
- f. Aminopenitsilliin-makroliid on ampitsilliin+erütromütsiin või ampitsilliin+roksitromütsiin

Viited

- Lin, LL, Hung, JN, Shiu, SI, et al, . Efficacy of prophylactic antibiotics for preterm premature rupture of membranes: a systematic review and network meta-analysis.Am J Obstet Gynecol MFM; 2023.
- Wolf, MF, Sgayr, I, Miron, D, et al, . A novel extended prophylactic antibiotic regimen in preterm pre-labor rupture of membranes: A randomized trial.Int J Infect Dis; 2020.