

Lisa 10. Avatud arterioosjuha kliinilised sümptomid

PDA	Sümptomid
Kliiniliselt oluline PDA Kliinilised sümptomid, mis viitavad PDA-le. Soovitav on korrelatsioon ehhoKG-ga	• Kahin südamel • Aktiivne <i>precordium</i> • Täitunud pulss • Madal diastoolne vererõhk ehk suur pulsirõhk
Sümpatomaatiline PDA Mõjutab vastsündinu üldseisundit. Raskesti kindlaks tehtav, kuna kliinilised PDA-le viitavad sümptomid on mitteseptsiifilised ega pruugi tegelikult olla seotud PDA olemasoluga	• Dünaamikas halvenev hingamisfunktsioon • Süvenevad või sagenevad apnoed • Kopsuverejooks (kõige spetsiifilisem, eriti koos halveneva hingamisfunktsiooniga) • Hüpotensioon
Hemodünaamiliselt oluline PDA EhhoKG leid, mis on kooskõlas suure šundivooluga. Rajaneb tavaliselt PDA läbimõõdul ning kaudsetel šundivoolu mahu markeritel	• PDA läbimõõt üle 1,5 mm • Vasaku koja laienemine: vasaku koja (LA) ja aordi-<i>bulbus</i>'e (Ao) diameetrite suhe üle 1,5 mm viitab olulisele šundile ja üle 2 mm väga suurele šundile • Vähene või retrograadne diastoolne verevool alanevas aordis, mesenteriaal- või tse-rebraalarterites • Diastoolne antegraadne vool kopsuarteri harudes. Lõppdiastoolne voolukiirus üle 0,2 m/s viitab olulisele ja üle 0,5 m/s väga suurele šundile