

Lisa 12. Empiirilise antibakteriaalse ravi annused (NEOFAX®)

Penitsilliin G: 25 000 – 50 000 TÜ/kg/dosi, veenisisene infusioon 15 min jooksul (meningiidi korral kahekordista annust)

Postmenstruaalvanus (nädalates)	Postnataalne vanus (päevades)	Doos (TÜ/kg/dosi)	Manustamise intervall (tundides)
≤ 29	0–28	25 000–50 000	12
30–36	0–14	25 000–50 000	12
37–44	0–7	25 000–50 000	12
> 44	kõik	25 000–50 000	12

Ampitsilliin: 25–50 mg/kg/dosi, veenisisese aeglaselt

Postmenstruaalvanus (nädalates)	Postnataalne vanus (päevades)	Doos (mg/kg/dosi)	Manustamise intervall (tundides)
≤ 29	0–28	25–50	12
30–36	0–14	25–50	12
37–44	0–7	25–50	12
> 44	kõik	25–50	12

Gentamütsiin: veenisisene infusioon perfuusoriga 30 min jooksul

Postmenstruaalvanus (nädalates)	Postnataalne vanus (päevades)	Doos (mg/kg/dosi)	Manustamise intervall (tundides)
≤ 29	0–7	5	48
30–34	0–7	4,5	36
≥ 35	kõik	4	24

NB! Vastsündinutel alates 34 GN soovitatakse kasutada vastavat kalkulaatorit (Kaiser)