

LISA 1

Tabel 6. PrEP-iga alustamine ja ravi jälgimine¹⁶

	Meestega seksivad mehed	Heteroseksuaalsed mehed ja naised	Narkootikumide süstivad inimesed
Oluline HIV-i nakatumise risk	<ul style="list-style-type: none"> • HIV-positiivne seksuaalpartner • Hiljutine bakteriaalne STLI • Suur seksuaalpartnerite arv • Ebajärjekindel või puuduv kondoomi kasutamine • Prostitutsioon 	<ul style="list-style-type: none"> • HIV-positiivne seksuaalpartner • Hiljutine bakteriaalne STLI • Suur seksuaalpartnerite arv • Ebajärjekindel või puuduv kondoomi kasutamine • Prostitutsioon • Elukohas või suhtlusringkonnas on kõrge HIV-i levimus 	<ul style="list-style-type: none"> • Narkootikumide „süstimissõber“ on HIV-positiivne • Süstimisvahendite jagamine
Kliiniliselt sobivad	<ul style="list-style-type: none"> • Enne profülaktika alustamist tehtav HIV 1,2 Ag + Ab test on negatiivne • Puuduvad ägeda HIV-infektsiooni sümptomid • Normaalne neerufunktsioon (Crea, eGFR) • Ei võta teisi ravimeid, mis on vastunäidustatud või omavad koostoimeid • Dokumenteeritud B-hepatiidi viirusinfektsiooni staatus (HBsAg, HBsAb, HBcAb) ja vaktsineerimise staatus 		
Ravimid ja väljastamine	<ul style="list-style-type: none"> • Profülaktikaskeemi kuulub TDF / FTC 300 mg / 200 mg üks kord päevas. Tuleb alustada seitse päeva enne esimest kokkupuudet ja võib lõpetada seitse päeva pärast viimast kokkupuudet. • Korruga väljastada kuni 90 päeva ravimid 		

Teised teenused	Regulaarsed kordusvisiidid vähemalt iga 3 kuu tagant: <ul style="list-style-type: none"> • teosta HIV 1,2 Ag + Ab test • hinda STLI sümptomite esinemist, iga 3–6 kuu tagant testida bakteriaalsete STLI-de suhtes • vii läbi nõustamine ravisoostumuse parandamiseks • hinda kõrvaltoimete esinemist • toeta käitumusliku riski vähenemist Kolm kuud pärast ravi alustamist ja seejärel iga kuue kuu tagant tuleb hinnata neerufunktsiooni (Crea, eGFR).leb hinnata neerufunktsiooni (Crea, eGFR).		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testi STLI suhtes 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinda soovi rasestuda • Teosta iga kolme kuu tagant verest hCG 	<ul style="list-style-type: none"> • Ligipääs süstla/nõela-vahetus-programmile ja narkootikumidest loobumise tugiteenustele

STLI – sugulisel teel leviv infektsioon

16 Tabel kohandatud: Centers for Disease Control and Prevention & US Department of Health and Human Services. Preexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection in the United States – 2017 Update: a clinical practice guideline. CDC & DHHS; 2018.